



VermiNIX™ Hönskvalster

Bekämpningsmedel mot hönskvalster

VARFÖR

- Registrerat och godkänt bekämpningsmedel
- Hönskvalster kan inte bli resistent mot Verminix
- Ren naturprodukt – 100% kiselgur
- Fri från nervgift

VAD

- Bekämpar hönskvalster, loppor och andra krypande skadeinsekter inom kategorin leddjur

VAR

- Kan användas överallt där hönskvalster förekommer, exempelvis i höns huset under systemet, i redena, sandbadet samt på sittpinnarna

HUR

- Sprid ut pulvret torrt (10-20 g/m²) alternativt blanda upp Verminix Hönskvalster med vatten (15 % lösning).

**GODKÄND FÖR
EKOLOGISK
ODLING**



Om Verminix Hönskvalster

VermiNIX Hönskvalster består av kiselgur, eller diatomacéjord, ett naturligt fossilt mineral som bildats av sedimentering av kiselalger. Verminix Hönskvalster bekämpar ohyran utan att påverka fjäderfån. Det har en starkt utrotande effekt på röda hönskvalster och andra krypande skadeinsekter som myror och loppor! Pulvret fastnar på ohyrans yttre hudskikt/vaxskikt. Ohyrans naturligt skyddande vaxskikt förstörs av pulvret och den dör av uttorkning. Verminix Hönskvalster ska förvaras torrt. Bli produkten fuktig återfår den sina egenskaper när vattnet avdunstat. Hittills har ingen resistens upptäckts!

Gör så här

Rengör lämpligen höns huset och ta ut hönsen innan spridning. Leta upp de röda hönskvalstrens gömställen (sprickor, håligheter, röranlutningar, övertäckta ytor) och täck med ett tunt lager Verminix Hönskvalster. Se till att sprida Verminix Hönskvalster så att kvalstren inte kan undgå att komma i kontakt med pulvret. Exempelvis under systemet, i redena, under redesmattorna, i sandbadet samt på sittpinnarna. Undvik att sprida Verminix Hönskvalster direkt på hönsen. Pulvret kan spridas ut torrt alternativt blandas med vatten (15 % lösning). Genom att använda den flytande lösningen undviks damm vid applicering och vidhäftningen förbättras. När vattnet avdunstat ligger ett tunt lager Verminix Hönskvalster kvar på de behandlade områdena.

VermiNIX Hönskvalster kan användas i förebyggande syfte. Upprepa behandlingen regelbundet vid behov, vid kraftiga problem ungefär var tredje månad. Beroende på angreppets omfattning ger Verminix Hönskvalster effekt inom 12-96 timmar. Låt pulvret verka i minst 7 dagar, helst upp till 3 veckor. Vid uppstädning och vid spridning till oönskade platser dammsug eller torka upp med fuktig trasa.

Försiktighetsåtgärder för användning

Använd insekticider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

Kiselgur 100%

CAS: 61790-53-2

Insekticid klass 3 reg.nr: 499 3

VermiNIX Hönskvalster levereras i 1 kg hink eller 15 kg säck